

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Panthenol-Sandoz 5 g/100 g Creme

Wirkstoff: Dexpanthenol

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g Creme enthalten 5,0 g Dexpanthenol

Sonstige Bestandteile:

Cetylalkohol (Ph. Eur.), Chlorhexidindiacetat, Glycerol, Glycerolmonostearat, mittelkettige Triglyceride, Natriumedetat (Ph. Eur.), Polyoxyethylen-20-glycerolmonostearat, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 25 g Creme (N 1)

Originalpackung mit 50 g Creme (N 1)

Originalpackung mit 100 g Creme (N 2)

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Arzneimittel zur Unterstützung der Wundheilung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning, E-mail: info@sandoz.de

Anwendungsgebiete

Alle Formen frischer und chronischer Hautschäden (Hautverletzungen), Schürfwunden, Wundliegen, einfache Brandwunden, chronische Geschwüre, Schrunden (spaltförmige Einrisse der Haut), z. B. an den Brustwarzen oder im Afterbereich, Hautentzündungen nach Strahleneinwirkung (Sonnenbrand, Röntgenstrahlen).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Panthenol-Sandoz 5 g/100 g nicht anwenden?

Sie dürfen Panthenol-Sandoz 5 g/100 g nicht anwenden, wenn Sie bereits auf Dexpanthenol oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich reagiert haben.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da nicht bekannt ist wie viel Dexpanthenol durch die Haut in den Blutkreislauf aufgenommen wird, sollte bei einer großflächigen Anwendung von Panthenol-Sandoz 5 g/100 g während der Schwangerschaft und Stillzeit der Nutzen der Anwendung sorgfältig gegen ein mögliches Risiko abgewogen werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Cetylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Bei der Behandlung mit Panthenol-Sandoz 5 g/100 g im Genital- oder Analbereich kann es wegen des Hilfsstoffes weißes Vaseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Panthenol-Sandoz 5 g/100 g nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Panthenol-Sandoz 5 g/100 g sonst nicht richtig wirken kann!

Wie und wie oft sollten Sie Panthenol-Sandoz 5 g/100 g anwenden?

Panthenol-Sandoz 5 g/100 g wird einmal bis mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen.

Nach der Anwendung sind die Hände aus hygienischen Gründen mit Seife zu waschen.

Wie lange sollten Sie Panthenol-Sandoz 5 g/100 g anwenden?

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

Sollten sich nach einer 14-tägigen Anwendung von Panthenol-Sandoz 5 g/100 g die Beschwerden nicht gebessert haben, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: Weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1 000 Behandelten	Selten: Weniger als 1 von 1 000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten: 1 Fall oder weniger von 10 000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Panthenol-Sandoz 5 g/100 g auftreten?

In sehr seltenen Fällen können bei der Anwendung von Panthenol-Sandoz 5 g/100 g Unverträglichkeitsreaktionen in Form von Kontaktallergien auftreten.

Welche Gegenmaßnahmen können Sie bei Nebenwirkungen ergreifen?

Sollte eine der genannten möglichen Nebenwirkungen auftreten, unterbrechen Sie die Behandlung und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Behältnis aufgedruckt. Verwenden

Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Die Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt 12 Monate.

Wie ist Panthenol-Sandoz 5 g/100 g aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Stand der Information

April 2004

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!